

La solución para inhalación TYVASO® (treprostinilo) y el polvo para inhalación TYVASO DPI® (treprostinilo) están aprobados para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar (HAP; Grupo 1 de la OMS) para mejorar la capacidad de ejercicio.

PEQUEÑOS MOMENTOS DE LA VIDA DISFRÚTELOS CON TYVASO.

Lo que necesita saber
acerca de TYVASO
para la HAP



Información importante de seguridad

Antes de recibir TYVASO o TYVASO DPI, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si usted:

- Tiene presión arterial baja.
- Tiene o ha tenido problemas de sangrado.

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento y en la página 15, y la ficha técnica completa adjunta y las Instrucciones de uso de TYVASO y TYVASO DPI en la solapa.

TYVASO DPI®
(treprostinil) INHALATION
POWDER

TYVASO®
(treprostinil) INHALATION
SOLUTION


Qué causa la HAP y sus síntomas

Las personas con hipertensión arterial pulmonar (HAP) tienen un desequilibrio de sustancias naturales, lo que provoca el estrechamiento de los vasos sanguíneos de los pulmones. Cuando estas sustancias están desequilibradas, es más difícil mantener la sangre fluyendo a través de los pulmones, y esto causa síntomas de HAP.

Hay medicamentos que tratan los desequilibrios, o vías, asociados a la HAP.

**VASO SANGUÍNEO
SANO EN LOS
PULMONES**

**VASO CON HAP EN
LOS PULMONES**



¿Qué es la prostaciclina?

La prostaciclina es una de las vías asociadas a la HAP. La prostaciclina ayuda a garantizar que los vasos sanguíneos estén sanos y abiertos, y es importante para el funcionamiento normal de los pulmones. Las personas con HAP pueden no producir suficiente prostaciclina en los pulmones.

TYVASO ayuda a sustituir la prostaciclina natural que le puede faltar.

TYVASO imita algunos de los efectos de la prostaciclina natural, lo que ayuda a abrir los vasos sanguíneos y mantener la sangre fluyendo a través de los pulmones.


¿Qué son TYVASO y TYVASO DPI?

La solución para inhalación TYVASO (treprostinilo) y el polvo para inhalación TYVASO DPI (treprostinilo) son medicamentos de venta con receta que se utilizan en adultos para tratar la hipertensión arterial pulmonar (HAP; grupo 1 de la OMS), que es la presión arterial alta en las arterias de los pulmones. TYVASO o TYVASO DPI pueden mejorar la capacidad de hacer ejercicio. Su capacidad para hacer ejercicio disminuye 4 horas después de recibir TYVASO o TYVASO DPI. Se desconoce si TYVASO o TYVASO DPI son seguros y eficaces en niños menores de 18 años.

Inhale profundamente...

TYVASO se inhala directamente en los pulmones.

TYVASO suministra rápidamente el medicamento en el lugar de la enfermedad, donde se necesita.



“He investigado la enfermedad. He investigado los medicamentos. Y considero que una de las tareas del cuidador es estar informado”.

— **Theresa**, cuidadora de Bill, quien recibe TYVASO DPI

Información importante de seguridad

Antes de recibir TYVASO o TYVASO DPI, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si usted (continuación):

- Tiene asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si alguno de estos medicamentos dañará a su bebé en gestación.
- Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si alguno de estos medicamentos pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor manera de alimentar a su bebé durante el tratamiento.

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento y en la página 15, y la ficha técnica completa adjunta y las Instrucciones de uso de TYVASO y TYVASO DPI en la solapa.

TYVASO DPI
(treprostinil) INHALATION
POWDER

TYVASO
(treprostinil) INHALATION
SOLUTION

TYVASO puede ayudarlo a hacer lo que más importa.

Camine más lejos en 6 minutos

En un estudio clínico, las personas que añadieron TYVASO a su tratamiento actual con el medicamento para la hipertensión arterial pulmonar (HAP) caminaron más lejos y mejoraron su prueba de caminata de 6 minutos (6-minute walk test, 6MWD)* en tan solo **6 semanas**.†

En una prueba de caminata de 6 minutos, las personas fueron capaces de caminar:

SIN TYVASO



10 ft (3 m) más

CON TYVASO



71 ft (21.6 m) más

Distancia después de 12 semanas de tratamiento (6MWD)

Logre hacer más en su día

Si añade TYVASO a su tratamiento actual, podrá hacer cosas como las siguientes:



“Soy capaz de mantenerme activo. Puedo hacer mis caminatas largas al aire libre, algo que tiene bastante impresionado a mi médico”.

— **Tracey**, paciente que recibe TYVASO DPI

*La prueba de caminata de 6 minutos (6MWD) es una prueba para ver cuán lejos puede caminar en 6 minutos.

†En el estudio clínico de 12 semanas de TYVASO, las personas que tomaban un medicamento oral para la HAP (bosentano o sildenafil) completaron una prueba de caminata de 6 minutos al principio y al final del estudio.

Información importante de seguridad

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que usa, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Cualquiera de estos medicamentos y otros medicamentos pueden afectarse entre sí.


Continuación del estudio

Después de las 12 semanas de estudio clínico, los pacientes que recibieron TYVASO podían continuar tomándolo, y los pacientes que habían recibido inicialmente un placebo podían empezar a recibir TYVASO.

Casi todos los pacientes que completaron el estudio inicial (97 %) decidieron continuar como parte del estudio de seguimiento a largo plazo.

Durante ese estudio, los investigadores hicieron un seguimiento de los pacientes para entender la dosis y la seguridad de TYVASO. También observaron cambios en sus 6MWD, su capacidad de estar activos y su tasa de supervivencia.

Los pacientes que recibieron TYVASO en el estudio clínico y continuaron bajo observación...



Es importante señalar que en este estudio, todos los pacientes estaban recibiendo TYVASO, y no se hizo ninguna comparación con las personas que no estaban recibiendo TYVASO. Por lo tanto, es difícil determinar con seguridad si estos resultados se deben a TYVASO.

Información importante de seguridad

Informe especialmente a su proveedor de atención médica si usa lo siguiente:

- Medicamentos utilizados para tratar la presión arterial alta o la cardiopatía.
- Medicamentos que reducen la coagulación de la sangre (anticoagulantes).

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento y en la página 15, y la ficha técnica completa adjunta y las Instrucciones de uso de TYVASO y TYVASO DPI en la solapa.

TYVASO DPI
(treprostinil) INHALATION POWDER

TYVASO
(treprostinil) INHALATION SOLUTION

Puede administrar TYVASO de
1 de 2 maneras

1 TYVASO DPI



El DPI de TYVASO cabe en la palma de la mano

TYVASO está disponible como inhalador
de polvo seco (**dry powder inhaler, DPI**).

Este inhalador **pequeño y portátil**
utiliza cartuchos precargados y
tiene un diseño **simple de usar**.

- **Cartuchos de dosis única**
precargados con medicamento.
- Solo **1 inhalación** por cartucho:
abrir, cargar, inhalar.
- **No se requiere limpieza.**



98 %

Tasa de satisfacción del paciente con TYVASO DPI

El DPI de TYVASO recibió puntuaciones de satisfacción altas por
parte de 45 de 46 personas en un estudio clínico que antes usaban
el nebulizador de TYVASO.*

*En el estudio clínico, 51 personas con HAP que habían estado usando el nebulizador de TYVASO durante al menos 3 meses cambiaron al DPI de TYVASO. Los investigadores registraron los efectos secundarios y, después de 3 semanas, 46 pacientes calificaron su satisfacción con el DPI de TYVASO en un cuestionario.



Vea un breve video sobre el uso de TYVASO DPI.
Visite **TYVASODPIDelivers.com**.

Información importante de seguridad

Informe especialmente a su proveedor de atención médica si usa lo siguiente
(continuación):

- Diuréticos.
- Gemfibrozil (Lopid®) o rifampicina (Rimactane®, Rifadin®, Rifamate®, Rifater®).

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento y
en la página 15, y la ficha técnica completa adjunta y las Instrucciones de uso
de TYVASO y TYVASO DPI en la solapa.

Trabaje con su médico para alcanzar su dosis óptima de TYVASO DPI

Su médico trabajará con usted para aumentar su dosis hasta que alcance su dosis óptima. Este proceso se denomina “ajuste de dosis”.

Planifique administrar su medicamento 4 veces por día, aproximadamente **cada 4 horas de vigilia**.

- Las dosis se administran en **1 inhalación** por cartucho
- La mayoría de las personas comienzan con el **cartucho de 16 µg, 4 veces al día**, y **aumentan** su dosis **cada 1 a 2 semanas** hasta alcanzar su dosis óptima.



No hay **una dosis máxima establecida** de TYVASO DPI. Su médico ajustará su dosis para determinar la concentración que mejor le convenga. Si se le receta una dosis superior a 80 µg, necesitará 2 o más cartuchos.



“Solo lleva menos de 30 segundos de mi tiempo recibir la dosis y continuar con mi día”.

— **Allison**, paciente de TYVASO DPI

Información importante de seguridad

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TYVASO o TYVASO DPI?

Ambos medicamentos pueden causar **efectos secundarios graves**, incluidos los siguientes:

- **Presión arterial baja** (hipotensión sintomática). Si tiene presión arterial baja, ambos medicamentos pueden reducir más la presión arterial.
- **Problemas hemorrágicos**. Ambos medicamentos pueden aumentar el riesgo de sangrado, especialmente en personas que reciben anticoagulantes (medicamentos que inhiben la coagulación).

TYVASO DPI
(treprostinil) INHALATION
POWDER

TYVASO
(treprostinil) INHALATION
SOLUTION

2 Nebulizador de TYVASO

El nebulizador de TYVASO se adapta a su día

El **nebulizador portátil de mano** es recargable, lo que le proporciona flexibilidad inalámbrica para tomar la dosis en casa o sobre la marcha.

**Una forma simple de recordar:
Cuenta hasta 4 y agregue 1 más**



1 Configure el dispositivo

1 vez cada mañana

2-3

Cada sesión dura alrededor
de 2 a 3 minutos

4

Use TYVASO **4 veces al día**
durante las horas que está despierto.

+1

Limpie el dispositivo **1 vez cada noche**



Vea un breve video sobre el uso del nebulizador de TYVASO. Visite [TYVASOnebulizerDelivers.com](https://www.tyvasonebulizerdelivers.com).

Información importante de seguridad

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TYVASO o TYVASO DPI? (continuación)

Los efectos secundarios más frecuentes de ambos son tos, dolor de cabeza, irritación y dolor de garganta, náuseas, enrojecimiento de la cara y el cuello (ruborización), desmayos o pérdida del conocimiento, mareos, diarrea y disnea. Al igual que otras prostaglandinas inhaladas, es posible que tenga problemas para respirar después de recibir TYVASO o TYVASO DPI porque puede causar que los músculos alrededor de las vías respiratorias se contraigan (broncoespasmo). Estos no son todos los posibles efectos secundarios. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios o si tiene problemas para respirar.



Trabaje con su médico para alcanzar su dosis óptima con el nebulizador TYVASO

Su médico trabajará con usted para aumentar la cantidad de inhalaciones por sesión cada semana hasta alcanzar su dosis óptima. A los pacientes del estudio clínico les llevó un promedio de 3 semanas alcanzar su dosis óptima.

Planifique administrar su medicamento 4 veces por día, aproximadamente **cada 4 horas de vigilia**.

- Una ampolla de TYVASO contiene suficiente medicamento para **las 4 sesiones de tratamiento** por día.
- La mayoría de los pacientes empiezan con **3 inhalaciones por sesión de tratamiento, 4 veces al día**, y aumentan el número de inhalaciones por sesión cada semana hasta alcanzar su dosis óptima

DOSIS INICIAL (PACIENTES NUEVOS EN TYVASO)

3 inhalaciones/
4 veces al día

Aumente en **3 inhalaciones por sesión de tratamiento** cada semana hasta alcanzar su dosis óptima

DOSIS ÓPTIMA

Según la dosis recetada/
4 veces al día

No hay **una dosis máxima establecida** de TYVASO. Su médico ajustará su dosis para determinar la concentración que mejor le convenga.

Información importante de seguridad

Antes de recibir TYVASO o TYVASO DPI, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si usted:

- Tiene presión arterial baja.
- Tiene o ha tenido problemas de sangrado.

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento y en la página 15, y la ficha técnica completa adjunta y las Instrucciones de uso de TYVASO y TYVASO DPI en la solapa.

TYVASO DPI
(treprostinil) INHALATION
POWDER

TYVASO
(treprostinil) INHALATION
SOLUTION

Alcance su dosis óptima para maximizar los beneficios

Su médico trabajará con usted para determinar su dosis óptima, lo cual es importante para que obtenga todos los beneficios del medicamento.



Qué esperar del ajuste de dosis

- A medida que aumente su dosis cada semana, podría experimentar efectos secundarios.
- Hable con su médico o el personal de enfermería para que lo ayuden a controlar los efectos secundarios.
- No deje de usar TYVASO sin hablar con su proveedor de atención médica.



“El único efecto secundario que tengo realmente es la tos. Tomo una gota de mentol para la tos, y la tos se calma.”*

— **Bill**, paciente de TYVASO DPI

*Los resultados individuales pueden variar.



Compare las opciones del dispositivo para administrar TYVASO. Visite TYVASO.com/pah/about-tyvaso.

Información importante de seguridad

Antes de recibir TYVASO o TYVASO DPI, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si usted (continuación):

- Tiene asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si alguno de estos medicamentos dañará a su bebé en gestación.
- Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si alguno de estos medicamentos pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor manera de alimentar a su bebé durante el tratamiento.

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento y en la página 15, y la ficha técnica completa adjunta y las Instrucciones de uso de TYVASO y TYVASO DPI en la solapa.

Asegúrese de recibir TYVASO 4 veces al día según las indicaciones de su médico.

Pueden presentarse efectos secundarios...

Los efectos secundarios más frecuentes de TYVASO son tos, dolor de cabeza, irritación y dolor de garganta, náuseas, enrojecimiento de la cara y el cuello (ruborización), desmayos o pérdida del conocimiento, mareos y diarrea. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de TYVASO.

No deje que los efectos secundarios le impidan obtener los beneficios de su medicamento. Asegúrese de ponerse en contacto con el equipo de atención médica sobre las medidas que puede tomar para ayudar a controlar los efectos secundarios **mientras continúa el tratamiento**, como por ejemplo:



TOS/IRRITACIÓN DE GARGANTA

- ✓ Revise la técnica adecuada para usar el dispositivo indicado.
- ✓ Antes del tratamiento, beba agua muy fría o muy caliente.
- ✓ Si es necesario, use un aerosol de garganta para adormecer la garganta antes del tratamiento.



DOLOR DE CABEZA

- ✓ Use un analgésico de venta libre, como paracetamol.

Hable con el médico para ver si ralentizar el ritmo con el que aumenta la dosis u optimizar otros medicamentos que recibe podría ayudar.

Estos consejos pueden ayudarle a controlar los efectos secundarios frecuentes de TYVASO, según la experiencia de los proveedores de atención médica. No deben considerarse asesoramiento médico.

Revise la técnica adecuada para su dispositivo en los Manuales de instrucciones de uso en la solapa o vea los videos sobre el modo de uso en [TYVASO.com](https://www.tyvaso.com).

Información importante de seguridad

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que usa, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Cualquiera de estos medicamentos y otros medicamentos pueden afectarse entre sí.

TYVASO DPI
(treprostinil) INHALATION
POWDER

TYVASO
(treprostinil) INHALATION
SOLUTION

Lo apoyamos de muchas maneras

Comienza con una llamada de una farmacia especializada.

TYVASO está disponible solo a través de farmacias especializadas, que se centran en proporcionarle capacitación en el hogar y apoyo las 24 horas. Su proveedor de farmacia especializada (Specialty Pharmacy, SP) es parte de su equipo de atención médica.




Qué ocurre a continuación: su proveedor de SP lo llamará.

¡Responda a la llamada! Cuando lo contacten por primera vez, el proveedor de SP puede llamarlo a través de un número de 866 u 877 que puede que no reconozca. Es importante responder a la llamada porque es posible que no pueda dejarle un mensaje debido a las normas de privacidad. Dado que no pueden hacerle llegar el medicamento a menos que hablen con usted, asegúrese de responder a la llamada para comenzar y seguir con el tratamiento.



Un miembro del personal de enfermería de la SP le dará instrucciones personales sobre el uso de TYVASO y le proporcionará apoyo continuo.

Un miembro del personal de enfermería de SP puede visitar o llamar regularmente cuando se sienta cómodo usando TYVASO.



Información importante de seguridad

Informe especialmente a su proveedor de atención médica si usa lo siguiente:

- Medicamentos utilizados para tratar la presión arterial alta o la cardiopatía.
- Medicamentos que reducen la coagulación de la sangre (anticoagulantes).
- Diuréticos.
- Gemfibrozil (Lopid®) o rifampicina (Rimactane®, Rifadin®, Rifamate®, Rifater®).

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento y en la página 15, y la ficha técnica completa adjunta y las Instrucciones de uso de TYVASO y TYVASO DPI en la solapa.

Inicio de su tratamiento con TYVASO



United Therapeutics Cares: unidos para usted

United Therapeutics Cares le ofrece educación y apoyo en forma continua y personalizada a partir del primer día de su experiencia con el nuevo tratamiento. Su asesor de pacientes especializado personalizará el apoyo y responderá preguntas sobre qué esperar cuando comience el tratamiento, la cobertura del seguro, la asistencia con los costos de bolsillo y el surtido de recetas.

Trabaje con su proveedor para inscribirse en United Therapeutics Cares. Visite UnitedTherapeuticsCares.com para obtener más información.

Si tiene alguna pregunta, llame al 1-844-864-8437 para hablar con su asesor de pacientes, de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 7:00 p. m., hora del este.



Programa de asistencia con copagos de United Therapeutics Cares

Los pacientes elegibles pagan un copago de tan solo \$0 por cada receta de TYVASO o de TYVASO DPI.

Los requisitos de elegibilidad para este programa son los siguientes:

- El programa es válido solo para pacientes con seguro comercial (también conocido como privado) que están recibiendo el medicamento para una indicación aprobada por la FDA.
- Los pacientes que utilizan Medicare, Medicaid o cualquier otro programa del gobierno estatal o federal para pagar sus medicamentos no son elegibles.
- Los pacientes que comiencen a utilizar la cobertura de sus medicamentos del gobierno durante el término del programa ya no serán elegibles.
- Los pacientes elegibles deben ser residentes de los EE. UU o los territorios de EE. UU.
- El programa está sujeto a restricciones adicionales de la ley estatal. Los pacientes que residan en determinados estados pueden no ser elegibles para el programa.

Visite UnitedTherapeuticsCaresCopoly.com para ver la información de inscripción completa, los detalles del programa y los términos y condiciones.

TYVASO DPI
(treprostinil) INHALATION
POWDER

TYVASO
(treprostinil) INHALATION
SOLUTION

Únase a las miles de personas que han elegido el tratamiento con TYVASO.

La decisión de añadir TYVASO a su vida es personal, pero cuando usted y su proveedor de atención médica lo hacen, debe saber que usted está entre miles de personas que han tomado la misma decisión.



Obtenga más información sobre las experiencias de los pacientes con TYVASO DPI.
Visite [TYVASO.com/pah/patient-videos](https://www.tyvaso.com/pah/patient-videos).



“Cambiar a TYVASO DPI ha sido un proceso bastante fácil para ambos”.

— **Theresa**, cuidadora de Bill, quien recibe TYVASO DPI



TYVASO es el medicamento de prostaciclina recetado n.º 1 para la HAP.

Comprometerse a ayudar a las personas con HAP

TYVASO es fabricado por United Therapeutics Corporation, una compañía fundada en 1996 por una pareja cuya hija tiene HAP. En United Therapeutics nos comprometemos a ayudar a las personas afectadas por la HAP.

Información importante de seguridad

Antes de recibir TYVASO o TYVASO DPI, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si usted:

- Tiene presión arterial baja.
- Tiene o ha tenido problemas de sangrado.
- Tiene asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si alguno de estos medicamentos dañará a su bebé en gestación.
- Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si alguno de estos medicamentos pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor manera de alimentar a su bebé durante el tratamiento.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que usa, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Cualquiera de estos medicamentos y otros medicamentos pueden afectarse entre sí.

Informe especialmente a su proveedor de atención médica si usa lo siguiente:

- Medicamentos utilizados para tratar la presión arterial alta o la cardiopatía.
- Medicamentos que reducen la coagulación de la sangre (anticoagulantes).
- Diuréticos.
- Gemfibrozil (Lopid®) o rifampicina (Rimactane®, Rifadin®, Rifamate®, Rifater®).

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TYVASO o TYVASO DPI?

Ambos medicamentos pueden causar **efectos secundarios graves**, incluidos los siguientes:

- **Presión arterial baja** (hipotensión sintomática). Si tiene presión arterial baja, ambos medicamentos pueden reducir más la presión arterial.
- **Problemas hemorrágicos**. Ambos medicamentos pueden aumentar el riesgo de sangrado, especialmente en personas que reciben anticoagulantes (medicamentos que inhiben la coagulación).

Los efectos secundarios más frecuentes de ambos son tos, dolor de cabeza, irritación y dolor de garganta, náuseas, enrojecimiento de la cara y el cuello (ruborización), desmayos o pérdida del conocimiento, mareos, diarrea y disnea. Al igual que otras prostaglandinas inhaladas, es posible que tenga problemas para respirar después de recibir TYVASO o TYVASO DPI porque puede causar que los músculos alrededor de las vías respiratorias se contraigan (broncoespasmo). Estos no son todos los posibles efectos secundarios. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios o si tiene problemas para respirar.

Puede informar efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de los EE. UU. en www.fda.gov/MedWatch o llame al 1-800-FDA-1088.

La información sobre los riesgos que se proporciona aquí no es exhaustiva. Para obtener más información sobre TYVASO o TYVASO DPI, hable con su proveedor de atención médica. Consulte la ficha técnica completa para **TYVASO** o **TYVASO DPI**, los Manuales de instrucciones de uso para **TD-100** y **TD-300** Sistema de inhalación TYVASO® y **Polvo para inhalación TYVASO DPI™**, y la información adicional en www.TYVASO.com o llame al 1-844-UNITHER (1-844-864-8437).

TYVISIconSEP2024(PAH)

TYVASO DPI
(treprostinil) INHALATION
POWDER

TYVASO
(treprostinil) INHALATION
SOLUTION

Inhale profundamente... y retome lo que realmente importa.



- ✓ TYVASO se inhala directamente a los pulmones para que pueda suministrar rápidamente el medicamento en el lugar de la enfermedad.
- ✓ Alcance su dosis óptima rápidamente.
- ✓ Camine más lejos y manténgase más activo con menos síntomas.
- ✓ Administre el medicamento en su hogar o dondequiera que esté con un inhalador que se ajusta a la palma de la mano o un nebulizador portátil sin cable.
- ✓ Reciba apoyo durante todo el tratamiento.



Visite TYVASOsupport.com para descargar recursos, ver videos e inscribirse para obtener apoyo y educación.

Información importante de seguridad

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TYVASO o TYVASO DPI? (continuación)

Los efectos secundarios más frecuentes de ambos medicamentos son tos, dolor de cabeza, irritación y dolor de garganta, náuseas, enrojecimiento de la cara y del cuello (ruborización), desmayos o pérdida del conocimiento, mareos, diarrea, y disnea. Al igual que otras prostaglandinas inhaladas, es posible que tenga problemas para respirar después de recibir TYVASO o TYVASO DPI porque puede causar que los músculos alrededor de las vías respiratorias se contraigan (broncoespasmo). Estos no son todos los posibles efectos secundarios. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios o si tiene problemas para respirar.

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento y en la página 15, y la ficha técnica completa adjunta y las Instrucciones de uso de TYVASO y TYVASO DPI en la solapa.



TYVASO y TYVASO DPI son marcas comerciales de United Therapeutics Corporation.

© 2026 United Therapeutics Corporation. Todos los derechos reservados. US/TYV/1201 Impreso en los EE. UU.

TYVASO DPI
(treprostinil) INHALATION
POWDER

TYVASO
(treprostinil) INHALATION
SOLUTION