

La solución para inhalación TYVASO® (treprostinilo) y el polvo para inhalación TYVASO DPI® (treprostinilo) están aprobados para el tratamiento de la hipertensión pulmonar asociada con la enfermedad pulmonar intersticial ([pulmonary hypertension associated with interstitial lung disease, PH-ILD]; grupo 3 de la OMS) para mejorar la capacidad de ejercicio.

Recupere los momentos que *dan sentido a su vida*

**DISFRÚTELOS CON
TYVASO PARA LA PH-ILD**



Información importante de seguridad

Antes de recibir TYVASO o TYVASO DPI, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si usted:

- Tiene presión arterial baja.
- Tiene o ha tenido problemas de sangrado.

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento y en las páginas 20 y 21, y la ficha técnica completa adjunta y las Instrucciones de uso de TYVASO y TYVASO DPI en la solapa.

DPI = inhalador de polvo seco (dry powder inhaler); OMS = Organización Mundial de la Salud.

TYVASO DPI®
(treprostinil) INHALATION
POWDER

TYVASO®
(treprostinil) INHALATION
SOLUTION



¿QUÉ ES LA PH-ILD?

Recibir el diagnóstico de PH-ILD puede ser abrumador. Pero aprender más al respecto y cómo se trata puede ayudarlo a sentirse más en control y con más esperanza.

PH-ILD significa hipertensión pulmonar asociada a enfermedad pulmonar intersticial.

Se trata de una afección rara y grave que afecta a los pulmones y a cómo fluye la sangre a través de ellos.

Vamos a desglosar el nombre “PH-ILD” para comprender mejor lo que significa y cómo encajan las piezas entre sí.

PH

Pulmonar significa que afecta a los pulmones.

Hipertensión significa presión arterial alta.

...Por lo tanto, *la hipertensión pulmonar* es la presión arterial alta en los pulmones.

ILD

Interstitial **L**ung **D**isease (enfermedad pulmonar intersticial) es un grupo de trastornos pulmonares progresivos graves que pueden dañar los pulmones y hacer que sea difícil respirar.

Algunos ejemplos de ILD son:

- Fibrosis pulmonar idiopática (idiopathic pulmonary fibrosis, IPF) o fibrosis pulmonar (pulmonary fibrosis, PF).
- Fibrosis pulmonar y enfisema combinados (combined pulmonary fibrosis and emphysema, CPFE).
- Enfermedad del tejido conectivo (connective tissue disease, CTD).

La PH y la ILD pueden presentarse al mismo tiempo

A veces, las personas con enfermedad pulmonar intersticial (interstitial lung disease, ILD) también pueden tener hipertensión pulmonar (pulmonary hypertension, PH), motivo por el que ve los términos juntos como uno. La PH suele ser difícil de diagnosticar porque sus síntomas, como disnea, fatiga y tos, pueden parecer muy similares a los de la ILD. No siempre es evidente que esté ocurriendo algo más.

¿SABÍA QUE...?

ES IMPORTANTE REALIZAR CONTROLES PERIÓDICOS PARA DETECTAR LA PH, porque puede aparecer en cualquier momento a medida que progresa la ILD.


De hecho, en la IPF (que es un tipo de ILD), la PH está presente en hasta el 15 % de los pacientes en las etapas iniciales de la IPF, o incluso en el momento del diagnóstico.

El impacto de la ILD + PH en su organismo



La ILD hace que el tejido pulmonar se vuelva rígido, lo que dificulta la respiración y que el oxígeno llegue a la sangre.

+



La PH hace que los vasos sanguíneos de los pulmones se vuelvan estrechos, lo que dificulta que la sangre fluya y provoca un aumento de la

=



El corazón debe realizar un mayor esfuerzo para impulsar la sangre a través de los pulmones, lo que puede provocar

¿QUÉ ES TYVASO?

TYVASO aumenta significativamente su capacidad de ejercicio, lo que le permite estar más activo con su familia y sus amigos. También reduce el riesgo de empeoramiento de la PH-ILD.

TYVASO puede marcar la diferencia en lo que puede hacer cada día

El tratamiento inmediato de la PH-ILD puede ser un paso hacia delante que usted da para su salud y puede ayudarlo a disfrutar más momentos de los que más importan.



En un estudio clínico, las personas que tuvieron PH-ILD y recibieron TYVASO caminaron más lejos y presentaron un riesgo significativamente menor de empeoramiento.



También se ha demostrado que TYVASO ayuda a reducir la sobrecarga en el corazón. TYVASO ayuda a mantener abiertos los vasos sanguíneos de los pulmones para que el corazón pueda bombear sangre con más facilidad.

Información importante de seguridad

Antes de recibir TYVASO o TYVASO DPI, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si usted (continuación):

- Tiene asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si alguno de estos medicamentos dañará a su bebé en gestación.
- Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si alguno de estos medicamentos pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor manera de alimentar a su bebé durante el tratamiento.

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento y en las páginas 20 y 21, y la ficha técnica completa adjunta y las Instrucciones de uso de TYVASO y TYVASO DPI en la solapa.



¿Hay efectos secundarios?

En un estudio clínico, los efectos secundarios fueron generalmente leves o moderados. Los más frecuentes fueron tos, dolor de cabeza e irritación/dolor de garganta.

Este folleto contiene información útil sobre posibles efectos secundarios y consejos que pueden ayudarlo a controlarlos.



*“Puedo participar en más actividades familiares. *”*

— Catherine, vive con PH-ILD y recibe TYVASO DPI

*Los resultados individuales pueden variar.

Información importante de seguridad

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que usa, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Cualquiera de estos medicamentos y otros medicamentos pueden afectarse entre sí.

Informe especialmente a su proveedor de atención médica si usa lo siguiente:

- Medicamentos utilizados para tratar la presión arterial alta o la cardiopatía.
- Medicamentos que reducen la coagulación de la sangre (anticoagulantes).
- Diuréticos.
- Gemfibrozil (Lopid®) o rifampicina (Rimactane®, Rifadin®, Rifamate®, Rifater®).

TYVASO DPI®
(treprostinil) INHALATION POWDER

TYVASO®
(treprostinil) INHALATION SOLUTION


LOS PACIENTES QUE RECIBIERON TYVASO CAMINARON DISTANCIAS MAYORES

Prueba de caminata de 6 minutos

La hipertensión pulmonar asociada con la enfermedad pulmonar intersticial (pulmonary hypertension associated with interstitial lung disease, PH-ILD) puede hacer que le resulte difícil caminar más allá de una distancia corta. La prueba de caminata de 6 minutos (6 minute walk test, 6MWT) puede darle una buena pista sobre en qué medida su enfermedad pulmonar podría estar afectando su capacidad para mantenerse activo.

Mide la distancia que puede caminar en 6 minutos.

En un estudio clínico de 16 semanas sobre la PH-ILD, se compararon 6MWT para las personas que recibieron TYVASO y las que recibieron un placebo (una solución inhalada sin medicamento).



Al final del estudio, las personas que recibieron TYVASO mejoraron la distancia que podían caminar en 6 minutos. Aquellos que recibieron un placebo experimentaron en realidad una disminución en la distancia que podían caminar.

*69 pies son unos 21 metros.

Información importante de seguridad

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TYVASO o TYVASO DPI?

Ambos medicamentos pueden causar **efectos secundarios graves**, incluidos los siguientes:

- **Presión arterial baja** (hipotensión sintomática). Si tiene presión arterial baja, ambos medicamentos pueden reducir más la presión arterial.
- **Problemas hemorrágicos**. Ambos medicamentos pueden aumentar el riesgo de sangrado, especialmente en personas que reciben anticoagulantes (medicamentos que inhiben la coagulación).

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento y en las páginas 20 y 21, y la ficha técnica completa adjunta y las Instrucciones de uso de TYVASO y TYVASO DPI en la solapa.



SE HA DEMOSTRADO
QUE TYVASO AYUDA
A LOS PACIENTES
CON PH-ILD A ESTAR
MÁS ACTIVOS.



Información importante de seguridad

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TYVASO o TYVASO DPI?
(continuación)

Los efectos secundarios más frecuentes de ambos son tos, dolor de cabeza, irritación y dolor de garganta, náuseas, enrojecimiento de la cara y el cuello (ruborización), desmayos o pérdida del conocimiento, mareos, diarrea y disnea. Al igual que otras prostaglandinas inhaladas, es posible que tenga problemas para respirar después de recibir TYVASO o TYVASO DPI porque puede causar que los músculos alrededor de las vías respiratorias se contraigan (broncoespasmo). Estos no son todos los posibles efectos secundarios. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios o si tiene problemas para respirar.

TYVASO DPI
(treprostinil) INHALATION
POWDER


TYVASO
(treprostinil) INHALATION
SOLUTION

REDUCIR LA SOBRECARGA EN EL CORAZÓN

TYVASO proporciona beneficios que quizá no perciba

TYVASO puede ayudar a reducir el estrés en su corazón, medido mediante un marcador llamado NT-proBNP. Los niveles elevados de NT-proBNP pueden indicar que su corazón está bajo mayor esfuerzo, lo que puede dificultar mantenerse activo, hacer ejercicio o realizar actividades cotidianas. Los niveles más bajos pueden indicar que su corazón está funcionando de forma más eficiente. Su médico puede monitorear los niveles de NT-proBNP a través de un análisis de sangre para ayudar a confirmar que TYVASO está actuando en el corazón; si los números son más bajos, hay menos tensión en el corazón.

En la semana 16 del estudio clínico, los pacientes que recibieron TYVASO tenían menos sobrecarga en el corazón (la NT-proBNP disminuyó en un 15 %), mientras que los pacientes que recibieron placebo tenían más sobrecarga en el corazón (la NT-proBNP aumentó en un 46 %).



Aunque el tratamiento puede afectar los resultados de los análisis de NT-proBNP, no se sabe cuánto pueden afectar a su afección esos cambios.

NT-proBNP = fracción N-terminal del péptido natriurético de tipo B (N-terminal pro-B-type natriuretic peptide).

Información importante de seguridad

Antes de recibir TYVASO o TYVASO DPI, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si usted:

- Tiene presión arterial baja.
- Tiene o ha tenido problemas de sangrado.
- Tiene asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

39 %
menos de
riesgo

de
empeoramiento
de la PH-ILD

REDUCIR EL EMPEORAMIENTO DE LA ENFERMEDAD

Durante el estudio de 16 semanas,
TYVASO ayudó a reducir el riesgo de
empeoramiento de la PH-ILD en un 39 %.



“Me ayuda a sentirme mejor. Me está ayudando a moverme mejor. Y eso es todo lo que puedo pedir.”*

— **Sally**, vive con PH-ILD y recibe TYVASO DPI

*Los resultados individuales pueden variar.

Información importante de seguridad

Antes de recibir TYVASO o TYVASO DPI, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si usted (continuación):

- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si alguno de estos medicamentos dañará a su bebé en gestación.
- Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si alguno de estos medicamentos pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor manera de alimentar a su bebé durante el tratamiento.


Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento y en las páginas 20 y 21, y la ficha técnica completa adjunta y las Instrucciones de uso de TYVASO y TYVASO DPI en la solapa.

TYVASO DPI®
(treprostini) INHALATION
POWDER

TYVASO®
(treprostini) INHALATION
SOLUTION

CÓMO FUNCIONA

TYVASO se inhala y va directamente a los pulmones, donde actúa para ayudar a abrir los vasos sanguíneos.



TYVASO
SUMINISTRA
RÁPIDAMENTE EL
MEDICAMENTO
EN EL LUGAR DE
LA ENFERMEDAD,
DONDE
SE NECESITA.

En el estudio clínico, los pacientes que recibieron TYVASO tenían más probabilidades de experimentar tos, dolor de cabeza e irritación/dolor de garganta que de experimentar náuseas y diarrea.

Información importante de seguridad

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que usa, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Cualquiera de estos medicamentos y otros medicamentos pueden afectarse entre sí.

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento y en las páginas 20 y 21, y la ficha técnica completa adjunta y las Instrucciones de uso de TYVASO y TYVASO DPI en la solapa.



SUS OPCIONES DE DISPOSITIVO PARA ADMINISTRAR TYVASO

El primer paso para sentirse cómodo con TYVASO es familiarizarse con su dispositivo. Hable con su proveedor de atención médica para averiguar cuál es la mejor opción para usted.



TYVASO DPI (inhalador de polvo seco)

TYVASO DPI se inhala con un inhalador compacto y portátil.



Nebulizador de TYVASO

TYVASO se inhala con un nebulizador portátil sin cable.



Compare las opciones del dispositivo para administrar TYVASO. Visite TYVASO.com/ph-ild/taking-tyvaso/how-to-take-tyvaso/

Información importante de seguridad

Informe especialmente a su proveedor de atención médica si usa lo siguiente:

- Medicamentos utilizados para tratar la presión arterial alta o la cardiopatía.
- Medicamentos que reducen la coagulación de la sangre (anticoagulantes).
- Diuréticos.
- Gemfibrozil (Lopid®) o rifampicina (Rimactane®, Rifadin®, Rifamate®, Rifater®).

TYVASO DPI®
(treprostinil) INHALATION POWDER

TYVASO®
(treprostinil) INHALATION SOLUTION

USO DE TYVASO

El DPI de TYVASO cabe en la palma de la mano

TYVASO está disponible como inhalador de polvo seco (**dry powder inhaler, DPI**).

Este inhalador **compacto y portátil** utiliza cartuchos y tiene un diseño **simple de usar**.

- **Cartuchos de dosis única** precargados con medicamento.
- Solo **1 inhalación** por cartucho: **abrir, cargar, inhalar**.
- Haga una inhalación normal y profunda para recibir cada dosis.



**NO SE
REQUIERE
LIMPIEZA**

98 %

Tasa de satisfacción del paciente con TYVASO DPI

El DPI de TYVASO recibió puntuaciones de satisfacción altas por parte de 45 de 46 personas en un estudio clínico que antes usaban el nebulizador de TYVASO.*

*En el estudio clínico, 51 personas con hipertensión arterial pulmonar (HAP) que habían estado usando el nebulizador de TYVASO durante al menos 3 meses cambiaron al DPI de TYVASO. Los investigadores registraron los efectos secundarios y, después de 3 semanas, 46 pacientes calificaron su satisfacción con el DPI de TYVASO en un cuestionario.



“Me resulta rápido y fácil recibir cada dosis”.

— **Catherine**, vive con PH-ILD y recibe TYVASO DPI

HAP = hipertensión arterial pulmonar.

Información importante de seguridad

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TYVASO o TYVASO DPI?

Ambos medicamentos pueden causar **efectos secundarios graves**, incluidos los siguientes:

- **Presión arterial baja** (hipotensión sintomática). Si tiene presión arterial baja, ambos medicamentos pueden reducir más la presión arterial.
- **Problemas hemorrágicos**. Ambos medicamentos pueden aumentar el riesgo de sangrado, especialmente en personas que reciben anticoagulantes (medicamentos que inhiben la coagulación).

Trabaje con su médico para alcanzar su dosis óptima de TYVASO DPI



Su médico trabajará con usted para aumentar su dosis hasta que alcance su dosis óptima. Este proceso se denomina “ajuste de dosis”.

Planifique administrar su medicamento 4 veces por día, aproximadamente **cada 4 horas de vigilia**.

- Las dosis se administran en 1 inhalación por cartucho.
- La mayoría de las personas comienzan con el **cartucho de 16 µg, 4 veces al día**, y aumentan su dosis cada **1 a 2 semanas** hasta alcanzar su dosis óptima.



No hay una dosis máxima establecida de TYVASO DPI. Su médico ajustará su dosis para determinar la concentración que mejor le convenga. Si se le receta una dosis superior a 80 µg, necesitará 2 o más cartuchos.

Información importante de seguridad

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TYVASO o TYVASO DPI? (continuación)

Los efectos secundarios más frecuentes de ambos son tos, dolor de cabeza, irritación y dolor de garganta, náuseas, enrojecimiento de la cara y el cuello (ruborización), desmayos o pérdida del conocimiento, mareos, diarrea y disnea. Al igual que otras prostaglandinas inhaladas, es posible que tenga problemas para respirar después de recibir TYVASO o TYVASO DPI porque puede causar que los músculos alrededor de las vías respiratorias se contraigan (broncoespasmo). Estos no son todos los posibles efectos secundarios. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios o si tiene problemas para respirar.

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento y en las páginas 20 y 21, y la ficha técnica completa adjunta y las Instrucciones de uso de TYVASO y TYVASO DPI en la solapa.

TYVASO DPI
(treprostinil) INHALATION POWDER

TYVASO
(treprostinil) INHALATION SOLUTION

USO DE TYVASO

El nebulizador de TYVASO se adapta a su día

El **nebulizador portátil de mano** es recargable, lo que le proporciona flexibilidad inalámbrica para tomar la dosis en casa o sobre la marcha.

Una forma simple de recordar: cuente hasta 4 y agregue 1 más

- 1** Configure el dispositivo **1 vez cada mañana**.
- 2-3** Cada sesión dura alrededor **de 2 a 3 minutos**.
- 4** Use TYVASO **4 veces al día** durante las horas que está despierto.
- +1** Limpie el dispositivo **1 vez cada noche**.



“Me adapté al uso de TYVASO con mucha rapidez y facilidad. Simplemente se ha convertido en parte de mi rutina normal”.

— **Catherine**, vive con PH-ILD y recibe TYVASO

Información importante de seguridad

Antes de recibir TYVASO o TYVASO DPI, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si usted:

- Tiene presión arterial baja.
- Tiene o ha tenido problemas de sangrado.
- Tiene asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento y en las páginas 20 y 21, y la ficha técnica completa adjunta y las Instrucciones de uso de TYVASO y TYVASO DPI en la solapa.



Trabaje con su médico para alcanzar su dosis óptima con el nebulizador TYVASO

Su médico trabajará con usted para aumentar la cantidad de inhalaciones por sesión cada semana hasta alcanzar su dosis óptima.

Planifique administrar su medicamento 4 veces por día, aproximadamente **cada 4 horas de vigilia**.

- Una ampolla de TYVASO contiene suficiente medicamento para **las 4 sesiones de tratamiento por día**.
- La mayoría de los pacientes empiezan con **3 inhalaciones por sesión de tratamiento, 4 veces al día**, y aumentan el número de inhalaciones por sesión cada semana hasta alcanzar su dosis óptima

DOSIS INICIAL (PACIENTES NUEVOS EN TYVASO)

3 inhalaciones/
4 veces al día

Aumente en 3 inhalaciones por
sesión de tratamiento cada semana
hasta alcanzar su dosis óptima

DOSIS ÓPTIMA

Según la dosis
recetada/4 veces al día

No hay una dosis máxima establecida de TYVASO. Su médico ajustará su dosis para determinar la concentración que mejor le convenga.

Información importante de seguridad

Antes de recibir TYVASO o TYVASO DPI, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si usted (continuación):

- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si alguno de estos medicamentos dañará a su bebé en gestación.
- Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si alguno de estos medicamentos pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor manera de alimentar a su bebé durante el tratamiento.

TYVASO DPI
(treprostinil) INHALATION
POWDER

TYVASO
(treprostinil) INHALATION
SOLUTION

Alcanzar su dosis óptima puede suponer una diferencia

A medida que su cuerpo se vaya adaptando al tratamiento, su médico lo ayudará a determinar la dosis adecuada para usted.

En un estudio clínico, los pacientes que alcanzaron dosis más altas de TYVASO mostraron **una mejora un 67 % mayor** y lograron caminar significativamente más lejos y mantenerse más activos tras 16 semanas.



7 a 9 inhalaciones

59 pies*



10 a 12 inhalaciones

98 pies*



**67 % MÁS
LEJOS EN
LA 6MWT**

Es importante alcanzar su dosis óptima para lograr los beneficios completos de su medicamento.

Qué esperar del ajuste de dosis

- A medida que aumente sus inhalaciones cada semana, podría experimentar efectos secundarios.
- Hable con el personal de enfermería o el médico para ayudarlo a controlar los efectos secundarios de modo que pueda alcanzar su dosis óptima.
- NO DEJE de usar TYVASO sin hablar con su proveedor de atención médica.



*“Después de unas semanas, sentí que podía respirar más profundamente y que podía caminar más lejos.”**

— Tina, vive con PH-ILD y recibe TYVASO

*Los resultados individuales pueden variar.

*59 pies es aproximadamente 18 metros. 98 pies es aproximadamente 30 metros.
6MWT = prueba de caminata de 6 minutos

Información importante de seguridad

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que usa, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Cualquiera de estos medicamentos y otros medicamentos pueden afectarse entre sí.

Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento y en las páginas 20 y 21, y la ficha técnica completa adjunta y las Instrucciones de uso de TYVASO y TYVASO DPI en la solapa.

Hacer un plan para preparar un nuevo medicamento

Su equipo de atención médica lo ayudará a comprender su medicamento, incluidos los posibles efectos secundarios. Los efectos secundarios más frecuentes son tos, dolor de cabeza, irritación de garganta, dolor y mareos. Tener un plan para controlar los posibles efectos secundarios puede ayudarlo a sentirse preparado y a seguir el tratamiento para obtener todos los beneficios de su medicamento.

Control de los efectos secundarios de su medicamento

Asegúrese de ponerse en contacto con el proveedor de atención médica sobre lo que puede hacer para ayudar a controlar los efectos secundarios **mientras continúa el tratamiento**, como por ejemplo:



TOS/IRRITACIÓN DE GARGANTA

- ✓ **Revise la técnica adecuada para usar el dispositivo indicado.**
- ✓ Antes del tratamiento, coma una pequeña cantidad de yogur, miel o mantequilla de maní, o beba agua muy fría o tibia.
- ✓ Si es necesario, use un aerosol de garganta para adormecer la garganta antes del tratamiento.



DOLOR DE CABEZA

- ✓ Use un analgésico de venta libre, como paracetamol.

Hable con el proveedor de atención médica para ver si ralentizar el ritmo con el que aumenta la dosis u optimizar otros medicamentos que recibe podría ayudar.

Estos consejos pueden ayudarle a controlar los efectos secundarios frecuentes de TYVASO, según la experiencia de los proveedores de atención médica. No pretenden ser consejos médicos.

Revise la técnica adecuada para su dispositivo en los Manuales de instrucciones de uso en la solapa o en TYVASO.com.

Información importante de seguridad

Informe especialmente a su proveedor de atención médica si usa lo siguiente:

- Medicamentos utilizados para tratar la presión arterial alta o la cardiopatía.
- Medicamentos que reducen la coagulación de la sangre (anticoagulantes).
- Diuréticos.
- Gemfibrozil (Lopid®) o rifampicina (Rimactane®, Rifadin®, Rifamate®, Rifater®).

TYVASO DPI®
(treprostinil) INHALATION
POWDER

TYVASO®
(treprostinil) INHALATION
SOLUTION

APOYO EN CADA PASO



United Therapeutics Cares le ofrece educación y apoyo en forma continua y personalizada a partir del primer día de su experiencia con el tratamiento con United Therapeutics.

Su asesor de pacientes especializado personalizará el apoyo y responderá preguntas sobre qué esperar cuando comience el tratamiento, la cobertura del seguro, la asistencia con los costos de bolsillo y el surtido de recetas.

Trabaje con su proveedor para inscribirse en United Therapeutics Cares. Visite UnitedTherapeuticsCares.com para obtener más información.

Si tiene alguna pregunta, llame al 1-844-864-8437 para hablar con su asesor de pacientes, de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 7:00 p. m., hora del este.

Trabajar con la farmacia especializada

TYVASO está disponible solo a través de farmacias especializadas, que se centran en proporcionarle capacitación en el hogar y **apoyo las 24 horas**. Su proveedor de farmacia especializada (Specialty Pharmacy, SP) es parte de su equipo de atención médica.



Primeros pasos:

Cuando el proveedor de SP lo contacte por primera vez, puede llamarlo a través de un número de **866** u **877** que puede que no reconozca. Dado que no pueden hacerle llegar el medicamento a menos que hablen con usted, **asegúrese de responder a la llamada para comenzar y seguir encaminado.**



Un miembro del personal de enfermería de la SP le dará instrucciones personales sobre el uso de TYVASO y le proporcionará apoyo continuo. Un miembro del personal de enfermería de SP puede visitar o llamar regularmente cuando se sienta cómodo usando TYVASO.

Información importante de seguridad

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TYVASO o TYVASO DPI?

Ambos medicamentos pueden causar **efectos secundarios graves**, incluidos los siguientes:

- **Presión arterial baja** (hipotensión sintomática). Si tiene presión arterial baja, ambos medicamentos pueden reducir más la presión arterial.
- **Problemas hemorrágicos**. Ambos medicamentos pueden aumentar el riesgo de sangrado, especialmente en personas que reciben anticoagulantes (medicamentos que inhiben la coagulación).



Programa de asistencia con copagos de United Therapeutics Cares*

Con el programa de asistencia de copagos de United Therapeutics Cares, los pacientes elegibles pagan un copago de tan solo \$0 por cada receta de TYVASO o TYVASO DPI.

Inscríbase hoy

**Descubra cómo inscribirse en UnitedTherapeuticsCaresCopay.com
o llame a United Therapeutics Cares al 1-844-864-8437
para hablar con su navegador de pacientes.**

**Los requisitos de elegibilidad para este programa son los siguientes:*

- El programa es válido solo para pacientes con seguro comercial (también conocido como privado) que estén recibiendo el medicamento para una indicación aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA).
- Los pacientes que utilicen Medicare, Medicaid o cualquier otro programa del gobierno estatal o federal para pagar sus medicamentos no son elegibles.
- Los pacientes que comiencen a utilizar la cobertura de sus medicamentos del gobierno durante el término del programa ya no serán elegibles.
- Los pacientes elegibles deben ser residentes de los EE. UU o los territorios de EE. UU.
- El programa está sujeto a restricciones adicionales de la ley estatal. Los pacientes que residan en determinados estados pueden no ser elegibles para el programa.

TYVASO DPI®
(treprostinil) INHALATION
POWDER

TYVASO®
(treprostinil) INHALATION
SOLUTION



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Antes de recibir TYVASO o TYVASO DPI, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si usted:

- Tiene presión arterial baja.
- Tiene o ha tenido problemas de sangrado.
- Tiene asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si alguno de estos medicamentos dañará a su bebé en gestación.
- Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si alguno de estos medicamentos pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor manera de alimentar a su bebé durante el tratamiento.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que usa, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Cualquiera de estos medicamentos y otros medicamentos pueden afectarse entre sí.

Informe especialmente a su proveedor de atención médica si usa lo siguiente:

- Medicamentos utilizados para tratar la presión arterial alta o la cardiopatía.
- Medicamentos que reducen la coagulación de la sangre (anticoagulantes).
- Diuréticos.
- Gemfibrozil (Lopid®) o rifampicina (Rimactane®, Rifadin®, Rifamate®, Rifater®).

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TYVASO o TYVASO DPI?

Ambos medicamentos pueden causar **efectos secundarios graves**, incluidos los siguientes:

- **Presión arterial baja** (hipotensión sintomática). Si tiene presión arterial baja, ambos medicamentos pueden reducir más la presión arterial.
- **Problemas hemorrágicos.** Ambos medicamentos pueden aumentar el riesgo de sangrado, especialmente en personas que reciben anticoagulantes (medicamentos que inhiben la coagulación).



Los efectos secundarios más frecuentes de ambos son tos, dolor de cabeza, irritación y dolor de garganta, náuseas, enrojecimiento de la cara y el cuello (ruborización), desmayos o pérdida del conocimiento, mareos, diarrea y disnea. Al igual que otras prostaglandinas inhaladas, es posible que tenga problemas para respirar después de recibir TYVASO o TYVASO DPI porque puede causar que los músculos alrededor de las vías respiratorias se contraigan (broncoespasmo). Estos no son todos los posibles efectos secundarios. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios o si tiene problemas para respirar.

Puede informar efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de los EE. UU. en www.fda.gov/MedWatch o llame al 1-800-FDA-1088.

¿Qué son TYVASO y TYVASO DPI?

La solución para inhalación TYVASO (treprostinilo) y el polvo para inhalación TYVASO DPI (treprostinilo) son medicamentos de venta con receta que se utilizan en adultos para tratar la hipertensión pulmonar asociada con la enfermedad pulmonar intersticial (PH-ILD; Grupo 3 de la OMS), que es la presión arterial alta en los pulmones debido a la inflamación y, en ocasiones, a la cicatrización en los pulmones. TYVASO o TYVASO DPI pueden mejorar la capacidad de hacer ejercicio.

La información sobre los riesgos que se proporciona aquí no es exhaustiva. Para obtener más información sobre TYVASO o TYVASO DPI, hable con su proveedor de atención médica. Consulte la ficha técnica completa para **TYVASO** o **TYVASO DPI**, los Manuales de instrucciones de uso para **TD-100** y **TD-300** Sistema de inhalación TYVASO® y **Polvo para inhalación TYVASO DPI**®, e información adicional en www.TYVASO.com o llame al 1-844-UNITHER (1-844-864-8437).

TYVISIconSEP2024(PH-ILD)

TYVASO DPI
(treprostinil) INHALATION
POWDER

TYVASO
(treprostinil) INHALATION
SOLUTION



Dé *el primer paso*

**HABLE CON SU MÉDICO PARA
ELABORAR UN PLAN QUE LE AYUDE
A APROVECHAR AL MÁXIMO TYVASO**

**TYVASO DPI es el
tratamiento prescrito
n.º 1 para la PH-ILD.**

TYVASO...

- ✓ es el primer medicamento aprobado por la FDA para tratar la PH-ILD;
- ✓ aumenta su capacidad para mantenerse activo;
- ✓ disminuye la probabilidad de que la PH-ILD empeore;
- ✓ reduce la cantidad de sobrecarga en el corazón;
- ✓ se administra directamente a los pulmones, donde se necesita;
- ✓ se administra con opciones de dispositivos portátiles que se adaptan a su día.

Avance con TYVASO

**Obtenga más información e inscribese para
recibir apoyo en TYVASOsignup.com.**

Información importante de seguridad

Los efectos secundarios más frecuentes de ambos son tos, dolor de cabeza, irritación y dolor de garganta, náuseas, enrojecimiento de la cara y el cuello (ruborización), desmayos o pérdida del conocimiento, mareos, diarrea y disnea. Al igual que otras prostaglandinas inhaladas, es posible que tenga problemas para respirar después de recibir TYVASO o TYVASO DPI porque puede causar que los músculos alrededor de las vías respiratorias se contraigan (broncoespasmo). Estos no son todos los posibles efectos secundarios. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios o si tiene problemas para respirar. **Consulte la Información importante de seguridad a lo largo del documento y en las páginas 20 y 21, y la ficha técnica completa adjunta y las Instrucciones de uso de TYVASO y TYVASO DPI en la solapa.**