

La solución para inhalación TYVASO® (treprostinilo) y el polvo para inhalación TYVASO DPI® (treprostinilo) están aprobados para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar (HAP; Grupo 1 de la OMS) para mejorar la capacidad de ejercicio.

PEQUEÑOS MOMENTOS DE LA VIDA. DISFRÚTALOS CON TYVASO.

Lo que necesita saber
acerca de TYVASO
para la HAP

TYVASO LE DA



Información de seguridad importante

Antes de recibir TYVASO o TYVASO DPI, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si usted:

- Tiene presión arterial baja.
- Tiene o ha tenido problemas de sangrado.

Consulte la Información de seguridad importante a lo largo del documento y en la página 15, y la Información de prescripción completa adjunta y las Instrucciones de uso de TYVASO y TYVASO DPI en el bolsillo.

TYVASO DPI®
(treprostinil) INHALATION
POWDER

TYVASO®
(treprostinil) INHALATION
SOLUTION


Acercas de su tratamiento para la HAP

Las personas con hipertensión arterial pulmonar (HAP) tienen un desequilibrio de sustancias naturales, lo que provoca el estrechamiento de los vasos sanguíneos de los pulmones. Cuando estas sustancias están desequilibradas, es más difícil mantener la sangre fluyendo a través de los pulmones, y esto causa síntomas de HAP.

Hay medicamentos que tratan los desequilibrios, o vías, asociados a la HAP.

VASO SANGUÍNEO
SANO EN LOS
PULMONES

VASO CON HAP EN
LOS PULMONES



¿Qué es la prostaciclina?

La prostaciclina es una de las vías asociadas a la HAP. La prostaciclina ayuda a garantizar que los vasos sanguíneos estén sanos y abiertos, y es importante para el funcionamiento normal de los pulmones. Las personas con HAP pueden no producir suficiente prostaciclina en los pulmones.

TYVASO ayuda para sustituir la prostaciclina natural que le puede faltar.


TYVASO imita algunos de los efectos de la prostaciclina natural, lo que ayuda a abrir los vasos sanguíneos y mantener la sangre fluyendo a través de los pulmones.

¿Qué son TYVASO y TYVASO DPI?

La solución para inhalación TYVASO (treprostinil) y el polvo para inhalación TYVASO DPI (treprostinil) son medicamentos de venta con receta que se utilizan en adultos para tratar la hipertensión arterial pulmonar (HAP; Grupo 1 de la OMS), que es la presión arterial alta en las arterias de los pulmones. TYVASO o TYVASO DPI pueden mejorar la capacidad de hacer ejercicio. Su capacidad para hacer ejercicio disminuye 4 horas después de recibir TYVASO o TYVASO DPI. Se desconoce si TYVASO o TYVASO DPI son seguros y eficaces en niños menores de 18 años.

Respíralo...

TYVASO se inhala directamente en los pulmones.



TYVASO suministra rápidamente el medicamento en el lugar de la enfermedad, donde se necesita.

Información de seguridad importante

Antes de recibir TYVASO o TYVASO DPI, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si usted (continuación):

- Tiene asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si alguno de estos medicamentos dañará a su bebé en gestación.
- Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si alguno de estos medicamentos pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor manera de alimentar a su bebé durante el tratamiento.

Consulte la Información de seguridad importante a lo largo del documento y en la página 15, y la Información de prescripción completa adjunta y las Instrucciones de uso de TYVASO y TYVASO DPI en el bolsillo.

TYVASO DPI
(fluticasolona) inhalación
powder

TYVASO
(fluticasolona) inhalación
powder

TYVASO puede ayudarlo a hacer lo que más importa.

Caminar más lejos en 6 minutos.

En un estudio clínico, las personas que añadieron TYVASO a su actual medicamento para la hipertensión arterial pulmonar (HAP) caminaron más lejos, mejorando su prueba de caminata de 6 minutos (6-minute walk test, 6MWD)* en tan solo **6 semanas**.†

En una prueba de caminata de 6 minutos, las personas fueron capaces de caminar:



Haga más en su día.

Cuando añade TYVASO a su tratamiento actual, podrá hacer cosas como las siguientes:



*La prueba de caminata de 6 minutos (6MWD) es una prueba para ver cuán lejos puedes caminar en 6 minutos.

†En el estudio clínico de 12 semanas de TYVASO, las personas que tomaban un medicamento oral para la HAP (bosentano o sildenafil) completaron una prueba de caminata de 6 minutos al principio y al final del estudio.

Información de seguridad importante

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Cualquiera de estos dos medicamentos pueden afectarse mutuamente con otros medicamentos.


Continuación del estudio

Después de las 12 semanas de estudio clínico, los pacientes que recibieron TYVASO podían continuar tomándolo, y los pacientes que habían recibido inicialmente un placebo podían empezar a recibir TYVASO.

Casi todos los pacientes que completaron el estudio inicial (97 %) decidieron continuar como parte del estudio de seguimiento a largo plazo.

Durante ese estudio, los investigadores hicieron un seguimiento de los pacientes para entender la dosis y la seguridad de TYVASO. También observaron cambios en sus 6MWD, su capacidad de estar activos y su tasa de supervivencia.

Los pacientes que recibieron TYVASO en el estudio clínico y continuaron siendo observados...



Es importante señalar que en este estudio, todos los pacientes estaban recibiendo TYVASO, y no se hizo ninguna comparación con las personas que no estaban recibiendo TYVASO. Por lo tanto, es difícil determinar con seguridad si estos resultados se deben a TYVASO.

Información de seguridad importante

Informe especialmente a su proveedor de atención médica si toma lo siguiente:

- Medicamentos utilizados para tratar la presión arterial alta o la cardiopatía
- Medicamentos que reducen la coagulación de la sangre (anticoagulantes)

Consulte la Información de seguridad importante a lo largo del documento y en la página 15, y la Información de prescripción completa adjunta y las Instrucciones de uso de TYVASO y TYVASO DPI en el bolsillo.

TYVASO DPI
(treprostini) INHALATION POWDER

TYVASO
(treprostini) INHALATION SOLUTION

Puede administrar TYVASO de 1 de 2 maneras

1 DPI de TYVASO

El DPI de TYVASO encaja en la palma de la mano

TYVASO está disponible en un inhalador de polvo seco (dry powder inhaler, **DPI**).

Este **inhalador** pequeño y portátil utiliza cartuchos precargados y tiene un diseño **simple de usar**.

- Solo **1 inhalación** por cartucho, **4 veces al día**.
- **No requiere** una respiración intensa.
- **No se requiere** limpieza.

Administrar una dosis es tan simple como: SOLO UNA RESPIRACIÓN: ABRIR, CARGAR, INHALAR



98 %

Tasa de satisfacción del paciente con TYVASO DPI

El DPI de TYVASO recibió puntuaciones satisfacción altas de 45 de 46 personas en un estudio clínico que cambiaron del nebulizador de TYVASO.*

*En el estudio clínico, 51 personas con HAP que habían estado usando el nebulizador de TYVASO durante al menos 3 meses cambiaron al DPI de TYVASO. Los investigadores registraron los efectos secundarios y, después de 3 semanas, 46 pacientes calificaron su satisfacción con el DPI de TYVASO en un cuestionario.



Vea un breve video sobre el uso de TYVASO DPI.
Visite [TYVASODPIDelivers.com](https://www.tyvasodpidelivers.com).

Información de seguridad importante

Informe especialmente a su proveedor de atención médica si toma lo siguiente (continuación):

- Diuréticos
- Gemfibrozil (Lopid®) o rifampicina (Rimactane®, Rifadin®, Rifamate®, Rifater®)

Consulte la Información de seguridad importante a lo largo del documento y en la página 15, y la Información de prescripción completa adjunta y las Instrucciones de uso de TYVASO y TYVASO DPI en el bolsillo.



Cómo administrar TYVASO con el DPI y cómo llegar a su dosis de mantenimiento objetivo


Su médico trabajará con usted para aumentar su dosis hasta que alcance su dosis de mantenimiento objetivo. Este proceso se denomina “ajuste de dosis”.

Planifique administrar su medicamento aproximadamente **cada 4 horas de vigilia.**

- Las dosis se administran en **1 inhalación** por cartucho
- La mayoría de las personas comienzan con el **cartucho de 16 mcg, 4 veces al día, y aumentan** su dosis **cada 1 a 2 semanas** hasta alcanzar su dosis de mantenimiento objetivo.

STARTING DOSE
1 breath per cartridge/
4x daily

TARGET DOSE
1 breath per cartridge/
4x daily



Información de seguridad importante

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TYVASO o TYVASO DPI?

Ambos medicamentos puede causar **efectos secundarios graves**, incluidos los siguientes:

- **Presión arterial baja** (hipotensión sintomática). Si tiene presión arterial baja, ambos medicamentos pueden reducir más la presión arterial.
- **Problemas hemorrágicos.** Ambos medicamentos pueden aumentar el riesgo de sangrado, especialmente en personas que reciben anticoagulantes).



Puede administrar TYVASO de 1 de 2 maneras

2 Nebulizador de TYVASO

El nebulizador de TYVASO se adapta a su día

Este **nebulizador portátil** permite la administración en su hogar o dondequiera que esté.

Una forma simple de recordar: Cuenta hasta 4 y agregue 1 más



- 1 Configure el dispositivo **1 vez cada mañana**
- 2-3 Cada sesión dura alrededor **de 2 a 3 minutos**
- 4 Use TYVASO **4 veces al día** durante las horas que está despierto
- +1 Limpie el dispositivo **1 vez cada noche**



Vea un breve video sobre el uso del nebulizador de TYVASO. Visite [TYVASOnebulizerDelivers.com](https://www.tyvaso.com/tyvasonebulizerdelivers.com).

Información de seguridad importante

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TYVASO o TYVASO DPI? (continuación)

Los efectos secundarios más frecuentes de ambos son tos, dolor de cabeza, irritación y dolor de garganta, náuseas, enrojecimiento de la cara y el cuello (ruborización), desmayos o pérdida de consciencia, mareos, diarrea y disnea. Al igual que otras prostaglandinas inhaladas, es posible que tenga problemas para respirar después de recibir TYVASO o TYVASO DPI porque puede causar que los músculos alrededor de las vías respiratorias se contraigan (broncoespasmo). Estos no son todos los posibles efectos secundarios. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios o si tiene problemas para respirar.



Cómo administrar TYVASO con el nebulizador y cómo llegar a su dosis de mantenimiento objetivo

Con el nebulizador de TYVASO, cada sesión de tratamiento dura alrededor de 2 a 3 minutos.

STARTING DOSE



TARGET DOSE



Su médico trabajará con usted para aumentar la cantidad de inhalaciones por sesión cada semana hasta alcanzar la dosis de mantenimiento objetivo.

- La dosis de mantenimiento objetivo es de **9 a 12 respiraciones, 4 veces al día**
- A los pacientes del estudio clínico les llevó un promedio de **3 semanas** alcanzar su **dosis objetivo**

Información de seguridad importante

Antes de recibir TYVASO o TYVASO DPI, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si usted:

- Tiene presión arterial baja.
- Tiene o ha tenido problemas de sangrado.

Consulte la Información de seguridad importante a lo largo del documento y en la página 15, y la Información de prescripción completa adjunta y las Instrucciones de uso de TYVASO y TYVASO DPI en el bolsillo.

TYVASO DPI
(treprostinil) INHALATION POWDER

TYVASO
(treprostinil) INHALATION SOLUTION

Alcanzar su dosis de mantenimiento objetivo para maximizar sus beneficios

Su médico trabajará con usted para alcanzar su dosis de mantenimiento objetivo, lo cual es importante para que obtenga todos los beneficios del medicamento.

Qué esperar del ajuste de dosis

- A medida que aumente su dosis cada semana, podría experimentar efectos secundarios
- Hable con su médico o enfermero para que lo ayuden a controlar los efectos secundarios
- No deje de usar TYVASO sin hablar con su proveedor de atención médica



TYVASO se ajusta a su rutina diaria



Al
despertar



A la hora del
almuerzo



A la hora
de la cena



A la hora de
acostarse



“Solo lleva menos de 30 segundos de mi tiempo recibir la dosis y continuar con mi día”.

— Allison, usuaria de TYVASO DPI



Obtenga más información sobre la experiencia de Allison con TYVASO DPI. Visite [TYVASOPatientJourneys.com](https://www.tyvaso.com/patient-journeys).

Información de seguridad importante

Antes de recibir TYVASO o TYVASO DPI, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si usted (continuación):

- Tiene asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si alguno de estos medicamentos dañará a su bebé en gestación.
- Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si alguno de estos medicamentos pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor manera de alimentar a su bebé durante el tratamiento.

**Asegúrese de recibir TYVASO
4 veces al día según las indicaciones
de su médico.**



Pueden presentarse efectos secundarios...

No deje que los efectos secundarios le impidan obtener los beneficios de su medicamento. Es importante que hable con su proveedor de atención médica y siga recibiendo TYVASO, a menos que se le indique que deje de hacerlo. Asegúrese de ponerse en contacto con el personal de enfermería sobre lo que puede hacer para ayudar a controlar los efectos secundarios mientras continúa el tratamiento, como por ejemplo:

TOS/IRRITACIÓN DE GARGANTA

- ✓ Revise la técnica adecuada.
- ✓ Antes del tratamiento, beba agua muy fría o muy caliente.
- ✓ Si es necesario, use un aerosol de garganta para adormecer la garganta antes del tratamiento.
- ✓ Hable con el proveedor de atención médica para ver si ralentizar el ritmo con el que aumenta la dosis podría ayudar.

NÁUSEAS

- ✓ Enjuague la boca con agua después del tratamiento.
- ✓ Hable con el proveedor de atención médica para ver si ralentizar el ritmo con el que aumenta la dosis podría ayudar.

DOLOR DE CABEZA

- ✓ Utilice un analgésico de venta libre, como el paracetamol; consulte con su proveedor de atención médica para ver si ralentizar el ritmo con el que aumenta su dosis puede ayudar.

Estos consejos pueden ayudarle a controlar los efectos secundarios frecuentes de TYVASO, según la experiencia de los proveedores de atención médica. No están destinados a ser considerados consejos médicos.

Revise la técnica adecuada para su dispositivo en los Manuales de instrucciones de uso en el bolsillo o mire los videos sobre el modo de uso en www.TYVASO.com.

Información de seguridad importante

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Cualquiera de estos dos medicamentos pueden afectarse mutuamente con otros medicamentos.

Consulte la Información de seguridad importante a lo largo del documento y en la página 15, y la Información de prescripción completa adjunta y las Instrucciones de uso de TYVASO y TYVASO DPI en el bolsillo.

TYVASO DPI
(treprostini) INHALATION
POWDER

TYVASO
(treprostini) INHALATION
SOLUTION

Lo apoyamos de muchas maneras.

Comienza con una llamada de una farmacia especializada.

TYVASO está disponible solo a través de Farmacias especializadas, que se centran en proporcionarle capacitación en el hogar y apoyo las 24 horas. Su proveedor de farmacia especializada (Specialty Pharmacy, SP) es parte de su equipo de atención médica.



Qué ocurre a continuación: Su proveedor de SP lo llamará.

¡Responda a la llamada! Cuando lo contacten por primera vez, el proveedor de SP puede llamarlo a través de un número de 866 u 877 que puede que no reconozca. Es importante responder a la llamada porque es posible que no pueda dejarle un mensaje debido a las normas de privacidad. Dado que no pueden hacerle llegar el medicamento a menos que hablen con usted, asegúrese de responder a la llamada para comenzar y seguir con el tratamiento.



Un enfermero de la SP le dará instrucciones personales sobre el uso de TYVASO y le proporcionará apoyo continuo. Su enfermero de SP puede visitar o llamar regularmente cuando se sienta cómodo usando TYVASO.

Información de seguridad importante

Informe especialmente a su proveedor de atención médica si toma lo siguiente:

- Medicamentos utilizados para tratar la presión arterial alta o la cardiopatía
- Medicamentos que reducen la coagulación de la sangre (anticoagulantes)
- Diuréticos
- Gemfibrozil (Lopid®) o rifampicina (Rimactane®, Rifadin®, Rifamate®, Rifater®)

Inicio de su tratamiento con TYVASO



United Therapeutics Cares: unidos para usted

United Therapeutics Cares le ofrece educación y apoyo en forma continua y personalizada a partir del primer día de su viaje con el nuevo tratamiento. Su asesor de pacientes especializado personalizará el apoyo y responderá preguntas sobre qué esperar cuando comience el tratamiento, la cobertura del seguro, la asistencia con los costos de bolsillo, el surtido de recetas, y le brindará recursos educativos para que pueda centrarse en lo que más importa.

Trabaje con su proveedor para inscribirse en United Therapeutics Cares. Visite [UnitedTherapeuticsCares.com](https://www.UnitedTherapeuticsCares.com) para obtener más información.

Si tiene alguna pregunta, llame al 1-844-864-8437 para hablar con su asesor de pacientes, de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 7:00 p. m., hora del este.



Programa de asistencia con copagos de United Therapeutics Cares

La mayoría de los pacientes elegibles pagan un copago de tan solo \$0 por cada receta de TYVASO o de TYVASO DPI.

Los requisitos de elegibilidad para este programa son los siguientes:

- Debe tener 18 años o más para utilizar este Programa.
- Los pacientes que utilizan Medicare, Medicaid o cualquier otro programa del gobierno estatal o federal para pagar sus medicamentos no son elegibles. Los pacientes que comiencen a utilizar la cobertura del gobierno durante el término del Programa ya no serán elegibles.
- El Programa es válido solo para pacientes con seguro comercial (también conocido como privado) que están recibiendo el medicamento para una indicación aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de los EE. UU.
- Los pacientes elegibles deben ser residentes en los Estados Unidos o Puerto Rico. El programa está sujeto a restricciones adicionales de la ley estatal. Los pacientes que residan en determinados estados pueden no ser elegibles para el Programa.

Visite www.UTcopay.com para ver la información de inscripción completa, los detalles del programa y los términos y condiciones.



Únase a las miles de personas que han elegido el tratamiento con TYVASO.

La decisión de añadir TYVASO a su vida es personal, pero cuando usted y su proveedor de atención médica lo hacen, debe saber que usted está entre miles de personas que han tomado la misma decisión.



“Ha hecho las cosas más fáciles para mí y me siento más lleno de energía con él”.

— **Bill**, usuario de TYVASO DPI



TYVASO es el medicamento de prostaciclina recetado n.º 1 para la HAP.

Comprometerse a ayudar a las personas con HAP

TYVASO es fabricado por United Therapeutics Corporation, una compañía fundada en 1996 por una pareja cuya hija tiene HAP. En United Therapeutics nos comprometemos a ayudar a las personas afectadas por la HAP.

Información de seguridad importante

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TYVASO o TYVASO DPI?

Ambos medicamentos puede causar **efectos secundarios graves**, incluidos los siguientes:

- **Presión arterial baja** (hipotensión sintomática). Si tiene presión arterial baja, ambos medicamentos pueden reducir más la presión arterial.
- **Problemas hemorrágicos**. Ambos medicamentos pueden aumentar el riesgo de sangrado, especialmente en personas que reciben anticoagulantes.

Información de seguridad importante

Antes de recibir TYVASO o TYVASO DPI, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si usted:

- Tiene presión arterial baja.
- Tiene o ha tenido problemas de sangrado.
- Tiene asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si alguno de estos medicamentos dañará a su bebé en gestación.
- Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si alguno de estos medicamentos pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor manera de alimentar a su bebé durante el tratamiento.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Cualquiera de estos dos medicamentos pueden afectarse mutuamente con otros medicamentos.

Informe especialmente a su proveedor de atención médica si toma lo siguiente:

- Medicamentos utilizados para tratar la presión arterial alta o la cardiopatía
- Medicamentos que reducen la coagulación de la sangre (anticoagulantes)
- Diuréticos
- Gemfibrozil (Lopid®) o rifampicina (Rimactane®, Rifadin®, Rifamate®, Rifater®)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TYVASO o TYVASO DPI?

Ambos medicamentos puede causar **efectos secundarios graves**, incluidos los siguientes:

- **Presión arterial baja** (hipotensión sintomática). Si tiene presión arterial baja, ambos medicamentos pueden reducir más la presión arterial.
- **Problemas hemorrágicos**. Ambos medicamentos pueden aumentar el riesgo de sangrado, especialmente en personas que reciben anticoagulantes).

Los efectos secundarios más frecuentes de ambos son tos, dolor de cabeza, irritación y dolor de garganta, náuseas, enrojecimiento de la cara y el cuello (ruborización), desmayos o pérdida de consciencia, mareos, diarrea y disnea. Al igual que otras prostaglandinas inhaladas, es posible que tenga problemas para respirar después de recibir TYVASO o TYVASO DPI porque puede causar que los músculos alrededor de las vías respiratorias se contraigan (broncoespasmo). Estos no son todos los posibles efectos secundarios. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios o si tiene problemas para respirar.

Puede informar efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (Food and Drug Administration, FDA) en www.fda.gov/MedWatch o llame al 1-800-FDA-1088.

La información sobre los riesgos que se proporciona aquí no es exhaustiva. Para obtener más información sobre TYVASO o TYVASO DPI, hable con su proveedor de atención médica. Consulte la Información de prescripción completa para **TYVASO** o **TYVASO DPI**, los Manuales de instrucciones de uso para el Sistema de inhalación TYVASO® **TD-100** y **TD-300** y el Polvo para inhalación **TYVASO DPI**®, e información adicional en **www.TYVASO.com** o llame al 1-844-UNITHER (1-844-864-8437).

TYVASO DPI
(treprostinil) INHALATION
POWDER

TYVASO
(treprostinil) INHALATION
SOLUTION

Respíralo... Y vuelve a lo que realmente importa



- ✓ TYVASO se inhala directamente a los pulmones para que pueda suministrar rápidamente el medicamento en el lugar de la enfermedad.
- ✓ Alcance su dosis de mantenimiento objetivo de manera rápida
- ✓ Camine más lejos y manténgase más activo con menos síntomas.
- ✓ Administre el medicamento en su hogar o dondequiera que esté con un inhalador que se ajusta a la palma de la mano o un nebulizador portátil sin cable.
- ✓ Reciba apoyo durante todo el tratamiento.

TYVASO LE DA



Visite TYVASOsupport.com para descargar recursos, mirar videos e inscribirse para obtener más información.

Información de seguridad importante

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TYVASO o TYVASO DPI? (continuación) Los efectos secundarios más frecuentes de ambos medicamentos son tos, dolor de cabeza, irritación y dolor de garganta, náuseas, enrojecimiento de la cara y del cuello (ruborización), desmayos o pérdida del conocimiento, mareos, diarrea, y falta de aire. Al igual que otras prostaglandinas inhaladas, es posible que tenga problemas para respirar después de recibir TYVASO o TYVASO DPI porque puede causar que los músculos alrededor de las vías respiratorias se contraigan (broncoespasmo). Estos no son todos los posibles efectos secundarios. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios o si tiene problemas para respirar.

Consulte la Información de seguridad importante a lo largo del documento y en la página 15, y la Información de prescripción completa adjunta y las Instrucciones de uso de TYVASO y TYVASO DPI en el bolsillo.



TYVASO y TYVASO DPI son marcas comerciales de United Therapeutics Corporation.

© 2024 United Therapeutics Corporation. Todos los derechos reservados. US/TYV/1038 Impreso en los EE. UU.

