

Prepárese para su tratamiento con TYVASO

Podría presentar efectos secundarios...

Su equipo de atención médica le ayudará a entender su medicación, incluidos los posibles efectos secundarios. Los efectos secundarios más frecuentes son tos, dolor de cabeza, irritación y dolor de garganta, y mareos. Tener un plan para controlar los posibles efectos secundarios puede ayudarle a sentirse preparado y a mantener el rumbo para obtener todos los beneficios de su medicamento.

Asegúrese de contactar a su equipo de atención médica para que le digan qué puede hacer para controlar los efectos secundarios mientras continúa su tratamiento, como, por ejemplo:



TOS

Revise la técnica correcta.

Antes del tratamiento, coma una pequeña cantidad de yogur, miel o mantequilla de maní, o beba agua muy fría o caliente.



DOLOR DE CABEZA

Use un analgésico de venta libre, como paracetamol.



IRRITACIÓN DE GARGANTA

Si es necesario, use un spray para la garganta para adormecerla antes del tratamiento.

Hable con su proveedor de atención médica para ver si reducir la velocidad de aumento de la dosis o ajustar los otros medicamentos que está tomando podría ayudarle.

Estas recomendaciones podrían ayudarle a controlar los efectos secundarios frecuentes de TYVASO, en función de la experiencia de los proveedores de atención médica. No se deben considerar consejos médicos.



Revise la técnica correcta de uso de su dispositivo en las Instrucciones que figuran en los manuales con las Instrucciones de uso que se encuentran en la solapa y vea los videos sobre Cómo usar el dispositivo en TYVASO.com.

Consejo de un paciente

“Los efectos secundarios de cada persona pueden ser distintos, por eso, es importante contactar al médico. Yo toso después de cada sesión, pero es una tos leve. Para controlar la tos, generalmente tomo un poco de agua.”

- Tracey, vive con HAP y toma TYVASO DPI.

¿Lo sabía?

La mayoría de los efectos secundarios de TYVASO son pasajeros y pueden mejorar a medida que el organismo se acostumbra al tratamiento.

Información importante de seguridad

Antes de tomar TYVASO o TYVASO DPI, hable con su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si usted:

- Tiene la presión arterial baja.
- Tiene o ha tenido problemas de sangrado.
- Tiene asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Lea la Información importante de seguridad que continúa al reverso y la Información completa de prescripción adjunta y las Instrucciones de uso de TYVASO y TYVASO DPI en la solapa.

TYVASO DPI
(treprostini) INHALATION POWDER

TYVASO
(treprostini) INHALATION SOLUTION

Información importante de seguridad

Antes de tomar TYVASO o TYVASO DPI, hable con su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si usted:

- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si alguno de los dos productos puede dañar al feto.
- Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si alguno de los dos productos pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor manera de alimentar a su bebé durante el tratamiento.

Informe a su proveedor de atención médica de todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados, los medicamentos de venta sin receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Cualquiera de los productos y otros medicamentos pueden interactuar entre sí.

Informe específicamente a su proveedor de atención médica si usted toma:

- Medicamentos que se usan para tratar la presión arterial elevada o enfermedades cardíacas.
- Medicamentos que disminuyen la coagulación de la sangre (anticoagulantes).
- Diuréticos.
- Gemfibrozilo (Lopid®) o rifampicina (Rimactane®, Rifadin®, Rifamate®, Rifater®).

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TYVASO o TYVASO DPI?

Ambos productos pueden causar **efectos secundarios graves**, incluidos:

- **Presión arterial baja** (hipotensión sintomática). Si tiene la presión arterial baja, cualquiera de los productos podrían bajarle la presión arterial aún más.
- **Problemas de sangrado**. Cualquiera de los productos puede aumentar el riesgo de sangrado, especialmente en personas que toman anticoagulantes.

Los efectos secundarios más frecuentes de ambos productos son tos, dolor de cabeza, irritación y dolor de garganta, náuseas, enrojecimiento del rostro y cuello (sofocos), desmayos o pérdida del conocimiento, mareos, diarrea y falta de aliento. Al igual que otras prostaglandinas inhaladas, podría presentar problemas para respirar después de usar TYVASO o TYVASO DPI ya que puede hacer que los músculos alrededor de las vías respiratorias se tensen (broncoespasmo). Estos no son todos los posibles efectos secundarios.

Llame a su médico para que le asesore sobre los efectos secundarios o si tiene problemas para respirar.

Puede reportar los efectos secundarios a la FDA en www.fda.gov/MedWatch o por teléfono al 1-800-FDA-1088.

¿Qué es TYVASO y TYVASO DPI?

La Solución para inhalación TYVASO (treprostinil) y el Polvo para inhalación TYVASO DPI (treprostinil) son medicamentos recetados que se usan en adultos para tratar:

- La hipertensión arterial pulmonar (HAP; grupo 1 según la OMS), que es presión arterial elevada en la sangre de las arterias de los pulmones. TYVASO o TYVASO DPI pueden mejorar la capacidad para hacer ejercicio. Su capacidad para hacer ejercicio disminuye 4 horas después de tomar TYVASO o TYVASO DPI. Se desconoce si TYVASO o TYVASO DPI es seguro y eficaz en menores de 18 años de edad.
- La hipertensión pulmonar asociada con enfermedad pulmonar intersticial (HP-EPI; grupo 3 según la OMS), que es presión arterial alta en los pulmones debido a la inflamación y a veces, fibrosis pulmonar. TYVASO o TYVASO DPI pueden mejorar la capacidad para hacer ejercicio.

La información sobre riesgos proporcionada no es completa. Para obtener más información sobre TYVASO o TYVASO DPI, hable con su proveedor de atención médica. Lea la Información de prescripción completa de TYVASO o TYVASO DPI, los manuales con las Instrucciones de uso del Sistema de inhalación TYVASO® TD-100 y TD-300 y el Polvo de inhalación TYVASO DPI®, y obtenga más información en www.TYVASO.com o por teléfono al 1-844-UNITHER (1-844-864-8437).

TYVISIconSEP2024